


LES COLIQUES

La définition d'une colique,

.....C'est une douleur importante dans l'estomac et les intestins. Ce n'est pas une maladie, c'est une combinaison de signes qui alerte sur la douleur abdominale du cheval. L'anatomie digestive du cheval étant très particulière (longueur et faible capacité) les dysfonctionnements se caractérisent par le ballonnement du ventre.



Quelques causes de coliques :

Les causes les plus communes de coliques sont :

- **l'excès de nourriture** (ex : incursion dans une "grainerie" dont la porte est restée ouverte et dont le bac à grains sera dévasté, trop grosse quantité d'herbe mangée en une fois...)
- **changement brutal de nourriture** : tous les aliments nouveaux devraient être donnés graduellement.
- **mauvaise qualité des aliments** : frelatés ou moisis, ou vieux.
- **Parasitisme** : l'infection de vers peut interrompre le transit.
- **Tics, ou vices**, comme tiquer à l'appui et mâchouiller du bois, ou tiquer tout court en avalant de l'air sont des causes de coliques récurrentes.
- **Horaire des repas** : (ex : un repas important avant de travailler)
- **Torsion des intestins**, mettant la vie du cheval en danger.

Les signes de coliques

Ceux-ci dépendent de la sévérité des coliques :

- au départ, le cheval peut boudier sa nourriture ou son eau
- **il gratte le sol**. Il transpire. Il se campe, comme s'il voulait uriner.
- **aucuns bruits de gargouillements** ne s'entendent dans le ventre, lorsque vous collez votre oreille sur celui-ci
- son **rythme respiratoire est fort**, ainsi que son rythme cardiaque.
- au fur et à mesure de la progression des coliques, le cheval commence à fouailler de la queue, regarde ses flancs ou les sent, en pouvant même grogner.
- **il peut s'asseoir comme un chien, ou se tenir couché sur le dos avec les jambes en l'air.**
- lorsque la douleur augmente, le cheval peut vouloir se donner des coups dans le ventre, **il se couche, se lève, se recouche, se relève, cherche à se rouler.**

A ce degré de coliques, il est extrêmement important de NE PAS LAISSER LE CHEVAL SE ROULER, car cela peut occasionner une torsion des intestins, et mettre la vie du cheval en danger, pouvant s'assortir d'une issue fatale.

Que faire : prendre le cheval en longe et le faire marcher en attendant le vétérinaire.



Les types de coliques :

... **Les coliques spasmodiques**, les plus répandues, sont dûes à des contractions de la paroi des intestins. Les chevaux ne sont pas très agités et peuvent même passer quelques crottins. Ils transpirent, regardent leurs flancs.

Les coliques occlusives, créées par un bouchon de matière dans le grand intestin (occasionné par l'ingestion excessive de litières : ex: paille, copeaux de bois ou de lin. Les chevaux se comportent de la même manière.

Les coliques gazeuses peuvent être les plus douloureuses. Plusieurs causes à celles-ci : fermentation de matières dues à une bien trop rapide et excessive ingestion d'herbe ou de granulés


Les parasites les plus répandus :

a) - **Les strongles** : les plus redoutables. Ils réduisent ou bloquent la circulation du sang dans les intestins. Ils provoquent des altérations de la muqueuse ainsi que des lésions ulcéreuses.

b) - **Les larves d'ascaris** : peuvent provoquer la rupture de l'intestin grêle et sont, souvent, en relation avec des dommages dans le foie et les poumons.

c) - **Le ténia**

Torsions d'intestins : c'est le diagnostic le plus dramatique : avec arrêt du transit, congestion mortelle, nécessité d'opérer en urgence lorsque cela est possible avec une issue souvent fatale.



Comment éviter les coliques

Un environnement sain et une façon de nourrir adaptée minimise les risques de coliques

Un programme régulier de vermifuges selon les saisons.

Cela inclut le ramassage des crottins dans les paddocks.

De l'eau claire et fraîche.

Plusieurs petits repas par jour plutôt qu'un grand repas qui aurait du mal à être digéré.

Des aliments de bonne qualité (ni vieux et frelatés, ni moisis).

Se préoccuper des dents.

De l'exercice régulier (stabulation libre idéale).

Etre certain que le cheval ne mange pas sa litière (paille ou autre ..).

Conclusion :

Ainsi, pour conclure, un bon encadrement permet de réduire les risques de coliques chez le cheval.

Sachez que, plus vous serez rapide à remarquer le comportement anormal de votre cheval, plus les coliques seront prises à la base et seront bénignes.

La venue du vétérinaire est cependant impérative, pour les soins qui doivent être dispensés